

Version	C	Date de validation	19/02/2020
Type de texte	VISKALI MP	Mise en application	06/03/2020

Dernière(s) modification(s) du document : Simplification suppression schéma

Tubes utilisés : Héparinate de lithium vert ou fluoré Gris

GLYCEMIE A JEUN ET POST PRANDIALE

Protocole :

Temps 0 : Premier prélèvement à 8h à jeun

Temps 1 : Deuxième prélèvement :

- soit 2h après le début du petit déjeuner sans changer ses habitudes alimentaires
- soit 2h après le début du déjeuner

CYCLE GLYCEMIQUE

Protocole :

Temps 0 : Premier prélèvement à 8h à jeun

Temps 1 : Deuxième prélèvement 2h après le début du petit déjeuner c'est à dire entre 10 et 11h (sans changer ses habitudes alimentaires)

Temps 2 : Troisième prélèvement 2h après le début du déjeuner soit entre 14 et 15h (idem pour habitudes alimentaires)

Temps 3 : (si nécessaire) Quatrième prélèvement à 18h.

HYPERGLYCEMIE PROVOQUEE

But du test :

Exploration des cellules Bêta des îlots de Langerhans du pancréas.
Freinage de la sécrétion de l'hormone de croissance (GH).

Protocole :

Temps 0 : Premier prélèvement à jeun de 12h

Le patient ingère ensuite la quantité de glucose prescrite par le médecin*.

Temps 1 et + : prélèvements suivants, selon la prescription ou **en général toutes les heures** jusqu'à T + 4 h.

Le prélèvement peut être toutes les ½ heures pendant 4 heures

Le patient restant au repos et à jeun de toute nourriture pendant toute la durée de l'épreuve

Si un dosage de glycosurie et d'insulinémie sont demandés, ils seront prélevés en même temps que le cycle.

*En l'absence de précision donner 1g /Kg de glucose sans dépasser les 100 gr.
Chez la femme enceinte donner 100 gr de glucose.

**TEST DE O'SULLIVAN
CHEZ LA FEMME ENCEINTE**

But du test :

Dépistage ou diagnostic d'un diabète gestationnel.

Protocole :

Temps 0 : Premier prélèvement à jeun de 12h
Puis ingestion de **50g** de glucose.

Temps 1 : Deuxième prélèvement à **1h**
La patiente étant restée au repos
dans l'intervalle de temps à jeun de
toute nourriture.

**HYPERGLYCEMIE PROVOQUEE DEUX TEMPS
(protocole OMS femme enceinte)**

But du test :

Dépistage ou diagnostic d'un diabète gestationnel

Protocole :

Temps 0 : Premier prélèvement à jeun de 12h
Puis ingestion de **75g** de glucose.

Temps 1 : Deuxième prélèvement à **2h**
La patiente étant restée au repos
dans l'intervalle de temps et à jeun
de toute nourriture.

**HYPERGLYCEMIE PROVOQUEE TROIS TEMPS
(protocole femme enceinte HAS)**

But du test :

Dépistage ou diagnostic d'un diabète gestationnel

Protocole :

Temps 0 : Premier prélèvement à jeun de 12h
Puis ingestion de **75g** de glucose

Temps 1 : Prélèvement à **1h**
Patiente étant restée au repos dans l'intervalle de temps et à jeun de toute
nourriture

Temps 2 : Prélèvement à **2h**
Patiente étant restée au repos dans l'intervalle de temps et à jeun de toute
nourriture