Version	A	**Date de validation**	16/02/2018
Type de texte	VISKALI MP	**Mise en application**	04/03/2018

Dernière(s) modification(s) du document :

DOSAGE DU CORTISOL : TEST AU DECTANCYL

TEST AU DECTANCYL RAPIDE

- ***But du test :***

Freinage de la cortico-surrénale afin de différencier les types d'hypercorticismes.
Dosage du cortisol sanguin.


- ***Tubes utilisés :***

Héparinate de lithium

- ***Protocole :***

J 0 : Entre 7h et 9h réaliser le premier prélèvement pour le dosage du cortisol sanguin.
J 0 minuit : Le patient prend deux comprimés de Dectancyl soit 1mg.
J 1 : Entre 7h et 9h réaliser le deuxième prélèvement.

Prélèvements :



Prise du Dectancyl

TEST AU DECTANCYL LENT

- ***But du test :***

Idem test au Dectancyl rapide : mais
Dosage du cortisol libre urinaire, 17 cétostéroides, 17 OH.

- ***Tubes utilisés :***

Flacon à urines pour recueil pendant 24h

- ***Protocole :***

J0 : A partir de 8h jeter les premières urines puis conserver les urines de 24h (jusqu'à J1 8h) et doser 17 Cétostéroides, 17 OH et Cortisol libre urinaire.
J1 : A 8h le patient prend deux comprimés de Dectancyl soit 1mg, de même à 16h et à minuit (3mg/jour toutes les 8h)
J2 à J7 : Continuer à prendre 3mg/jour toutes les 8h de Dectancyl.
J7 : Conserver les urines de 24h (jusqu'à J8 8h) et doser 17 Cétostéroides, 17 OH et Cortisol libre urinaire.

Ce document ne doit être ni photocopié, ni imprimé sans l'autorisation du service qualité

DOSAGE DU CORTISOL : TEST AU SYNACTHENE

CONTRE INDIQUE EN CAS D'ASTHME

SYNACTHENE IMMEDIAT

- ***But du test :***

Exploration de la cortico-surrénale par stimulation par l'ACTH (synacthène)du cortisol

- ***Tubes utilisés :***

Héparinate de lithium

- ***Préparation du patient :***


Patient à jeun depuis 12 heures avec arrêt du traitement par corticoïde depuis 48 heures il doit être au repos pendant 10 minutes.

- ***Protocole :***

Temps 0 : Le premier prélèvement est réalisé entre 7h et 8h. (on peut éventuellement doser 17OH progestérone).
Injecter en intramusculaire l'ampoule de 0,25mg de synacthène immédiat.
Temps 1 : deuxième prélèvement
Temps 2 : troisième prélèvement
Le patient étant resté au repos dans l'intervalle de temps.

Puis garder le patient sous surveillance pendant une heure

Prélèvements



SYNACTHENE RETARD

- ***But du test :***

Exploration de la cortico-surrénale par stimulation l'ACTH (synacthène)du cortisol.

- ***Tubes utilisés :***

Héparinate de lithium


- ***Préparation du patient :***

Patient à jeun depuis 12 heures avec arrêt du traitement par corticoïde depuis 48 heures il doit être au repos pendant 10 minutes.

- ***Protocole :***

J 0 : Le premier prélèvement est réalisé entre 7h et 8h. (on peut éventuellement doser 17Oh progestérone).
Recueillir les urines 24h.
J 1 : Injecter en intramusculaire l'ampoule de 1mg de synacthène retard.
Réaliser à nouveau un prélèvement après 30mn, 1h, 2h, 4h, 8h.
Le patient étant resté au repos dans l'intervalle de temps.
Recueillir les urines de 24h.
J 2 : Réaliser un prélèvement entre 7h et 8h.

Prélèvements



Ce document ne doit être ni photocopié, ni imprimé sans l'autorisation du service qualité