

Version	A	Date de validation	16/02/2018
Type de texte	VISKALI MP	Mise en application	04/03/2018

Dernière(s) modification(s) du document :

PLAIE, LESIONS CUTANEEES, ESCARRES...

Au préalable, une détersion au sérum physiologique de la zone à prélever sera réalisée.

Prélèvement sur peau saine ou sur lésion non suintante

Prélever 2 écouvillons préalablement imbibés de sérum physiologique. (dacron clinique, milieu de transport autres sites).

Si mycologie demandée (recherche de dermatophytes), gratter les squames à la curette

Et récupérer le matériel dans une boîte de Pétri

Peau avec lésions cutanées superficielles

En cas d'impetigo, ecthyma, bulles, folliculite, furoncle, anthrax, par exemple, prélever 2 écouvillons préalablement imbibés de sérum physiologique. (dacron clinique, milieu de transport autres sites).

Inflammation cutanée, érysipèle, hypodermite :

Désinfecter le site puis, à l'aide d'une seringue et d'une aiguille stérile fine, injecter dans la lésion un peu de sérum physiologique stérile et ré-aspirer au maximum. Compléter ensuite à 1ml de sérum physiologique stérile en rinçant la seringue pour éviter toute dessiccation du prélèvement puis boucher stérilement.

Morsures

Aspirer le liquide présente dans la blessure avec une seringue et le recueillir comme indiqué supra. A défaut, après désinfection des zones proximales, pratiquer un écouvillonnage profond. Utiliser un milieu de transport si l'acheminement au laboratoire n'est pas immédiat.

Lésions unguéales

Couper toute la partie de l'ongle atteint avec des ciseaux stériles jusqu'à la limite des tissus sains. Il est aussi possible de prélever des poussières d'ongles en raclant la tablette interne de l'ongle. Placer ensuite les différents fragments dans un flacon stérile à acheminer rapidement au laboratoire.

Plaies superficielles

Pour les infections superficielles du site opératoire, prélever l'écoulement de la cicatrice de préférence par aspiration à la seringue ou pratiquer une biopsie. L'écouvillonnage de la cicatrice doit être évité.

Ulcérations, escarres, lésion scutanées nécrotiques

Nettoyer la plaie et les exsudats après avoir débridé les tissus nécrosés si nécessaire. Appliquer ensuite l'antiseptique cutané et laisser sécher. Rincer au sérum physiologique stérile. Réaliser une biopsie ou cureter le bord actif de la lésion et placer l'échantillon dans un flacon stérile à acheminer rapidement au laboratoire. Eventuellement, aspirer à l'aiguille fine le liquide inflammatoire produit. L'écouvillonnage doit être évité.